



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گیلان

## تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

### CCHF

#### راه های پیشگیری:

#### مبارزه با انگل خارجی و ناقل (کنه هیالوما)



- برای جدا کردن کنه از بدن دام حتما از دستکش استفاده نماید
- دامداران در هنگام تماس با دام از لباس های پوشیده با رنگ روشن استفاده کنند و بعد از کار لباسها حتما تعویض شود



- همچنین بهتر است از جوراب ضخیم و بلند یا چکمه در باغات ، مزارعه و محل نگهداری دام در مناطق اندمیک استفاده شود
- استفاده از دور کننده حشرات مثل پریمترین بر روی پوست ، لباس و کفش توصیه می شود

#### تماس مستقیم و ترشحات آلوده دامی در حین ذبح یا زایمان دام موجب انتقال بیماری می شود



خطر انتقال بیماری در طی ذبح یا بلا فاصله پس از آن بسیار است لذا توصیه می شود به مدت ۲۴ ساعت لاشه دام پس از ذبح در یخچال نگهداری شود و سپس با پوشیدن دستکش آن را قطعه قطعه کرده و مورد مصرف قرار گیرد.

بر روی خون و ترشحات دام محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱ به ۱۰ ریخته شود و پس از ۱۵ دقیقه با آب و مواد شوینده شسته شود .

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی استان گیلان